

# PRINTZLAU

## PRIVATHOSPITAL

### Fedtransplantation til ansigtet

#### Information

**Formål:** Fedttransplantation er en operation, der har til formål at udfylde dybe furer eller gruber i ansigtet eller give ansigtet mere fylde. Formålet er at forbedre ansigtsfaconen, og fedttransplantation er meget velegnet til ansigter der har tabt fylden med alderen.

**Generelt:** Ved en fedttransplantation kan man opnå en moderat forøgelse af fylden af vævet (volumen). I ansigtet er det ofte en vurdering om man ønsker en vævsfylder ("filler") med en sprøjte (f.eks. Restylane) eller en fedttransplantation. Transplantation af fedt giver større fylde og resultatet er holdbart i mange år, forudsat at fedtcellerne slår an.

**Teknik:** Operationen udføres enten i fuld bedøvelse eller lokalbedøvelse evt. suppleret med indsprøjtning af smertestillende medicin og sovemidler afhængig af operationens størrelse. Det fedt, der skal transplanteres, tages som regel fra maven ved en fedtsugning. I det område, hvorfra man skal tage fedtet, indsprøjtes lokalbedøvende væske i for at mindske blødning. Specielle sugekanyler føres gennem små stikkanaler ind i fedtvævet f. eks. på maven, og der suges, indtil der er fjernet en passende mængde fedt. Det udsugede sterile fedt præpareres med bl. a. let centrifugering, så man har næsten rent fedt, der indsprøjtes i lange tynde baner på det sted, hvor man ønsker volumenforøgelse i ansigtet.

**Forløb:** De implanterede områder i ansigtet må ikke belastes, man må ikke gnubbe eller massere de behandlede områder og man må ikke ligge på de transplanterede områder d.v.s. man må ikke ligge på maven. Evt tråde fjernes efter ca. 7 dage. Smerter behandles med mild smertestillende medicin. Man bør være oppegående, og arbejdet kan ofte genoptages efter få dage til 1 uge. Sport kan påbegyndes efter 3-4 uger, når ømheden har fortaget sig.

**Bivirkninger:** Ømhed, hævelse, misfarvning og føleforstyrrelser af de behandlede områder samt ujævnheder under huden hører med til et normalt forløb.

**Komplikationer:** Ved en fedttransplantation må man regne med at noget af fedtet ikke "slår an" d.v. s. at noget af fedtet forsvinder indenfor den første tid. Egentlige komplikationer er sjældne og kan bestå i blodansamlinger, infektioner og føleforstyrrelser i huden. Den største risiko er, at fedtet delvis forsvinder, og patienten derfor ikke opnår det resultat der forventes.

**Forventet resultat:** Øget fylde af væv der udglatter furer og giver mere fylde i ansigtet. Evt. skal fedttransplantationen gentages en eller flere gange for opnå det ønskede resultat. Der er 1 uges betænkningstid fra konsultation til operation må foretages. Samtykke til operation kan først gives efter udløb af betænkningstiden. Man kan medbringe en ledsager til konsultationen.

Eeva Kalaja Petersen

Version 2.0/Gældende fra August 2023/Revideres August 2026/Udarbejdet af: ek/Ansvar/godkendt: ap

# PRINTZLAU

PRIVATHOSPITAL

Speciallæge i plastikkirurgi

