

PRINTZLAU

PRIVATHOSPITAL

Vejledning før din operation i lokalbedøvelse

Regler for din vanlige medicin før operationen

I forbindelse med operationen skal du tage din medicin som vanligt.

Der er dog følgende undtagelser / pausetider før operation

- **3 dage før stoppes** Hjerdyl®, Hjertemagnyl®, Xarelto, Eliquis, Pradaxa, Brilique.
- **5 dage før stoppes** Kodimagnyl®, Treo, Ibuprofen, Ipren
- **7 dage før stoppes** Kosttilskud, herunder fiskeolie.
- **7 dage før stoppes** Plavix, Copidogrel, Marevan og Marcumar.
- **10 dage før stoppes** Tenoxicam (Tilcotil®).

Din kirurg på Printzlau Privathospital vil evt. nedsætte pausetiderne ift. dit indgreb. Du vil i så fald blive informeret.

Smertestillende efter indgreb

Husk at købe Panodil til hjemmebrug

Mad og drikke

Det er god ide at have spist og drukket lidt hjemmefra. Vi har også drikkevarer til dig.

Ankomst / Udskrivelse

Når du ankommer skal du henvende dig i **sengeafdelingen**. Du vil blive modtaget af en sygeplejerske, som forbereder dig til operation.

Tag gerne løstsiddende tøj på.

Undlad at medbringe smykker og andre værdigenstande.

Du er meget velkommen til at tage en pårørende med. Vi anbefaler, at du ikke selv kører hjem efter indgrebet.

Du udskrives kort tid efter indgrebet, ca. 15 min – ½ time.

Kirurg

Du hilser på plastikkirurgen, som sikrer samtykke til operation og enighed om operationsplanen, tegner op til operationen og evt. tager billeder.

Kontakt til Printzlau Privathospital

Du får ved udskrivelsen udleveret et tlf. nr. og mail, hvor du kan kontakte hospitalets vagthavende sygeplejerske.

I weekenden passer vi mail og telefon hjemmefra, hvilket betyder, at der går lidt tid imellem, at vi ser, hvad der er indkommet af spørgsmål og besvarer disse. Vi modtager ikke sms.

- Mail: sygepleje@printzlau.com
- Tlf. 50 94 03 08

Ved meget alvorlige akutte problemer skal du kontakte vagtlæge eller ambulance direkte, ligesom du ville have gjort, hvis du ikke var blevet opereret.